



¿QUÉ ES PHYTOGARD, Y LOS BENEFICIOS DE SU USO?

- Es un fertilizante líquido que posee en su formulación el ion fosfito.
- Promueve las defensas naturales de las plantas.
- Es absorbido por ramas, troncos y raíces.
- Estimula las defensas endógenas de la planta mediante el incremento de las fitoalexinas.
- Induce el ión fosfonato responsable de contrarrestar la acción de patógenos de origen fúngicos.
- Suministra Fósforo, Potasio y Zinc. Nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas.

• Phytogard en dos formulaciones; Phytogard Potasio y Phytogard Zinc •



• Composición Química •

Fósforo P ₂ O ₅	40%	596 g/L
Potasio K ₂ O	20%	298 g/L

Solución Concentrada de Potasio y Fósforo
Fuente de P₂O₅: Ácido Fosforoso
Densidad: 1,49 g/L



• Composición Química •

Fósforo (P ₂ O ₅)	40%	580 g/L
Zinc (Zn)	10%	145 g/L

Valores en % peso/volumen
Densidad: 1,45 g/L

• Características de Phytogard (Potasio y Zinc) •

- Entre el 90% y el 98% del producto es absorbido entre 3 y 20 horas después de la aplicación.
- Promueve la sanidad de la planta contrarrestando el ataque de enfermedades.
- Mejora el metabolismo de las plantas incrementando la calidad y rendimientos.
- Fortalece los tejidos contra condiciones de estrés biótico (plagas y enfermedades) y abiótico (climas adversos).
- Favorece la calidad de las cosechas.
- Es ecológicamente amigable ya que respeta la flora y la fauna.

FICHA TÉCNICA



• CULTIVO	• DOSIS	• OBSERVACIÓN
Hortalizas en General	200-300 cc/100 L agua	Aplicar preventivamente, iniciando las aplicaciones a los 7-10 días después del trasplante o la detección de algún agente patógeno.
Cultivos Anuales	200-300 cc/100 L agua	Aplicar preventivamente, iniciando las aplicaciones a los 7-10 días después del establecimiento o la detección de algún agente patógeno.
Limonero, Naranja, Mandarino, Pomelo, Manzana, Peral, Uva de Mesa, Durazno, Cerezo, Nectarin, Kiwi, Nopal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Olivos, Frutillas, Frambuesos y Arándanos.	4-6 L/ha (200-300 cc/100 L agua)	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación (20-30 cm) del frutal o a la detección de algún agente patógeno. Hacer 3-6 aplicaciones durante la temporada. En cítricos iniciar las aplicaciones si las condiciones de humedad son favorables para el desarrollo del patógeno.
Paltos	6-10 L/ha	Aplicar mínimo 2 veces por cada flush de crecimiento radicular o durante el ciclo completo del cultivo.
Ornamentales y Floricultura	1-2 L/ha	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación del cultivo o a la detección de algún agente patógeno. Hacer 3-6 aplicaciones durante la temporada.



• CULTIVO	• DOSIS	• OBSERVACIÓN
Hortalizas en General	100-200 cc/100 L agua	Aplicar preventivamente, iniciando las aplicaciones a los 7-10 días después del trasplante o la detección de algún agente patógeno.
Cultivos Anuales	150-300 cc/100 L agua	Aplicar preventivamente, iniciando las aplicaciones a los 7-10 días después del establecimiento o la detección de algún agente patógeno.
Limonero, Naranja, Mandarino, Pomelo, Manzana, Peral, Uva de Mesa, Durazno, Cerezo, Nectarin, Kiwi, Nopal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Olivos, Palto, Frutillas, Frambuesos y Arándanos.	200-300 cc/100 L agua	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación (20-30 cm) del frutal o a la detección de algún agente patógeno. Hacer 3-6 aplicaciones durante la temporada.
Ornamentales y Floricultura	1-2 L/ha	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación del cultivo o a la detección de algún agente patógeno. Hacer 3-6 aplicaciones durante la temporada.

• PHYTOGARD® tiene acción sistémica, translocándose por toda la planta (ascendente y descendente) con larga acción residual.

* Se recomienda no mezclar con productos que contengan altos niveles de calcio, magnesio o hierro.

* No mezclar con compuestos a base de cobre y con productos que tengan reactividad en soluciones ácidas.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- PHYTOGARD®
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:

Zona Norte,
III y IV Región
Alvaro Villarreal
+56 9. 3 224 0339

Zona Norte,
III y IV Región
Ulises Pizarro
+56 9. 9 534 2016

Zona Centro,
V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

Zona Centro,
Región Metropolitana
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424

Zona Centro,
VI Región Norte
Alejandro Guajardo
+56 9. 8 916 2012

Zona Centro,
VI Región Sur
Marta Solís
+56 9. 9 451 4354

Zona Sur, VII Región
Paula Vargas
+56 9. 9 451 4384

Zona Sur, VIII Región
Fabian Suescun
+56 9. 9 630 6790

Zona Sur, IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

Zona Sur, XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239



Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.

dtecnico@stoller.cl
stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.A
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.