

ReZist®



CARACTERÍSTICAS

- ReZist® es un activador genético que contiene en su formulación cobre, zinc y manganeso, promoviendo la tolerancia natural a distintos tipos de stress.
- La formulación de ReZist® permite mantener el metabolismo de las plantas en equilibrio.
- Los micro elementos presentes en el producto promueven la actividad enzimática y el funcionamiento de la planta.

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Zinc (Zn)	1,75%
Cobre (Cu)	1,75%
Manganeso (Mn)	1,75%

Cofactores Hormonales
(Valores expresados en % peso/volumen)

pH	9,5
Densidad (g/L)	1200 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Cereales	1 - 1,5 L/ha	3 - 4 aplicaciones
Hortalizas en general y papas	250 - 300 cc / 100 L agua	Aplicar a los 10 días antes de transplante, repitiendo a los 30 y 60 días después, según necesidad.
Manzano, peral, naranjo, pomelo, limonero, mandarino, palto, almendro, nectarino, cerezo, ciruelo, nogal, duraznero, damasco, olivo, arándano, frambueso, frutilla, uva de mesa y viñas.	1 - 1,5 L/ha	Aplicar a inicio de brotación y repetir durante la temporada en función de la necesidad.
Kiwi	1 L/ha	Aplicar desde inicio de brotación y cada 7 días hasta completar 4 aplicaciones., buscando promover la tolerancia natural de las plantas a estrés de tipo abiótico y biótico. Apoyar con una aplicación de 1 l/ha pre cosecha si fuese necesario.
Cerezo	2 L/ha	Para recuperación de huerto con alto daño por estrés abiótico. Aplicar desde inicio de brotación cada 7 a 10 días.
	1,5 L/ha	Para reactivación de huerto con nivel moderado de daño por estrés abiótico. Aplicar desde inicio de brotación cada 7 a 10 días.
	1 L/ha	Para mantención de una alta actividad metabólica del huerto, con nivel moderado de daño por estrés abiótico. Aplicar desde inicio de brotación cada 15 a 20 días.

*Las aplicaciones no deben superar el 1% de concentración de ReZist®.



Ciclo que controla la producción de etileno y poliaminas.

ReZist® DISMINUYE EL ETILENO y POR LO TANTO EL ESTRÉS

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:
 1- Agua 2- **ReZist®** 3- Agroquímico

Stoller en su región es:



Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.A
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| XV Región
Alvaro Villarroel
+56 9. 3 224 0339 | III Y IV Región
Ulises Pizarro Felipe Pizarro
+56 9. 9 534 2016 +56 9. 3 443 3941 | V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268 | Región Metropolitana
Oriana Reyes Josefa Bitsch
+56 9. 4 248 8538 +56 9. 3 379 4332 | VI Región
Alejandro Guajardo Nicolás Torres
+56 9. 8 916 2012 +56 9. 9 451 4354 |
| VII Región
Paula Vargas
+56 9. 9 451 4384 | VIII Región
Luis Milla
+56 9. 9 630 6790 | IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875 | XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239 | Jefe Regional Zona Norte (III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385 |
| | | | | Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424 |