



- Producto líquido diseñado para entregar promotores hormonales a la fruta, mejorando la división celular y desarrollo del fruto.
- El producto permite mejorar el tamaño y calidad de los frutos, promoviendo una mejor acumulación de nutrientes y una mejor condición en post cosecha.

**COMPOSICIÓN QUÍMICA**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Citoquininas        | 0,025% |
| Ácido Giberélico    | 0,003% |
| Ácido Indolbutírico | 0,009% |
| Ácido Indolacético  | 0,006% |

**INSTRUCCIONES DE USO**

| CULTIVO                                     | DOSIS        | APLICACIÓN   |
|---|--------------|--|
| Cerezos, Arándanos                          | 0,5-1 L/ha   | Caída de pétalos repitiendo cada 7 días hasta completar 4 aplicaciones                 |
| Kiwis                                       | 0,5L/ha      | Fruto recién cuajado, repetir a los 10 días.   |
| Almendro, ciruelas, nectarines, duraznos    | 0,5L/ha      | Caída de chaqueta, repetir a los 7 días 2 a 3 aplicaciones según necesidad.            |
| Manzanos, peras                             | 0,5 L/ha     | Caída de pétalos repitiendo cada 7 días hasta completar 3 aplicaciones.                |
| Frutillas                                   | 0,25 L/ha    | Caída de pétalos repitiendo cada 7 días hasta completar 3 aplicaciones.                |
| Maíz Silo                                   | 0,5 L/ha     | V3 - V6  |
| Hortalizas                                  | 0,25 L/ha    | Entre 4 a 5 hojas según necesidad.   |
| Uva de Mesa                                 | 1 - 1.5 L/ha | Junto a giberélico de crecimiento.   |
| Nogal                                       | 0,5-1,0 L/ha | Aplicar en fruto cuajado y inicio de crecimiento de fruto.                             |
| Cítricos: Mandarino, Pomelo, Limón, Naranja | 1-1,5 L/ha   | Aplicar en el momento de fruto recién cuajado, fruto 14 y 21mm de diámetro ecuatorial. |

**Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.**

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- **FRUIT SIZER**
- 3- Agroquímico

**Stoller** en su región es:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>XV Región</b><br>Alvaro Villarreal<br>+56 9. 3 224 0339                                 | <b>III Y IV Región</b><br>Ulises Pizarro   Felipe Pizarro<br>+56 9. 9 534 2016   +56 9. 3 443 3941 | <b>V Región</b><br>Luisa Baeza<br>+56 9. 6 845 3268     | <b>Región Metropolitana</b><br>Oriana Reyes   Josefa Bitsch<br>+56 9. 4 248 8538   +56 9. 3 379 4332 | <b>VI Región</b><br>Alejandro Guajardo   Nicolás Torres<br>+56 9. 8 916 2012   +56 9. 9 451 4354 |
| <b>VII Región</b><br>Paula Vargas   Nicole Guzmán<br>+56 9. 9 451 4384   +56 9. 3 469 1858 | <b>VIII Región</b><br>Fabián Suescun<br>+56 9. 9 630 6790  | <b>IX Región</b><br>Camilo Quezada<br>+56 9. 4 010 6875 | <b>XIV y X Región</b><br>Antonio Villagra<br>+56 9. 9 537 5239                                       | <b>Jefe Regional Zona Norte (III a VI)</b><br>Fredy Morales<br>+56 9. 9 451 4385                 |
|  |  |   |  | <b>Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV)</b><br>Claudio Romero<br>+56 9. 9 161 8424                 |



Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.

stoller@stoller.cl  
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.A.  
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.  
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.