



Receso Invernal	Estado de Balón	Botón Floral	Plena Flor/Aparición de Primeras Hojas	Caída de Chaqueta	Fruto Recién Cuajado	Quiebre de Color y Precosecha	Post Cosecha 1 (Época Estival)	Post Cosecha 2 (Fin Época Estival)
8 %		3 L/ha	3 L/ha	3 L/ha	3 L/ha	4 Kg/ha	4 Lg/ha	1,5 - Kg/ha
<b>ProStart PLUS</b>	<b>STIMULATE FRUIT SIZER</b>	<b>FLOWER POWER</b>	<b>Foli-Zyme</b>	<b>SETT</b>	<b>SETT</b>	<b>Harvest More</b> <small>5-5-45</small>	<b>PHYTOGARD</b> <small>Potasio</small>	<b>Harvest More BORO</b>
+ 6% Nitrato de Calcio	1 Aplicación de 1 L/ha	+ 0,5 - 0,75 L/ha	2-3 Aplicaciones + 1 L/ha	+ 1 L/ha	+ 1 L/ha	+ 4 L/ha	+ 1 - 1,5 L/ha	+ 3 L/ha
Para homogenizar: Aplicar 20-30 días antes de inicio de Floración.		<b>BIO-HOLD</b>	<b>ReZist</b>	<b>STIMULATE FRUIT SIZER</b>	<b>ReZist</b>	<b>SUGAR MOVER</b>	<b>ReZist</b>	<b>Keylate</b> —MAGNESIO
Para adelantar: Aplicar ± 7 días después de la fecha de aplicación de cianamida		2-3 Aplicaciones. Repetir cada 7 días hasta plena flor	+ 3 L/ha			+ 20 ppm	+ 2 Kg/ha	+ 5-6 L/ha
		+ 3 L/ha	<b>SETT</b>			<b>N-LARGE</b>	<b>KEY FEEDS · MICROMIX</b>	<b>NITRATE BALANCER PLUS</b>
		+ 1 L/ha	+ 1 L/ha			+ 3 L/ha	+ 3 L/ha	Aplicar con las primeras hojas amarillas
		<b>STIMULATE FRUIT SIZER</b>	<b>STIMULATE FRUIT SIZER</b>			<b>ALGROW</b>	<b>ALGROW</b>	
			<b>ALGROW</b>			Aplicar en pre cosecha		
	<b>Calcium PLUS Soil</b>	2-3 aplicaciones 20 L/ha						
	<b>RootFEED Concentrate</b>	Cada 10-15 días hasta completar 100 L/ha (10-15 L/aplicación)						
<b>HELADAS O ESTRÉS</b>	<b>BIO-FORGE</b>	<b>SETT</b>	<b>Foli-Zyme</b>	<b>APLICAR DE INMEDIATO DESPUES DE UNA HELADA</b>				
Dosis	1 L/ha	Dosis 4 L/ha	Dosis 3 L/ha					





### ProStart PLUS® + NITRATO CALCIO

- Si busca homogenizar, se recomienda utilizar el producto acompañado de 6 kg de Nitrato de Calcio por 100 L de agua. Realizar aplicación de 30 a 20 días antes de inicio de brotación. En el caso de aplicaciones más tardías, se recomienda aplicar el producto sin nitrato de calcio.
- Si se busca precocidad acompañado de 6 kg de Nitrato de Calcio por 100 L/Agua. realizar esta aplicación 7 días después de la Cianamida Hidrogenada.
- Para plantas en formación. Aplicar 7-10 días antes del inicio de brotación.

### FLOWER POWER® + BIO-HOLD®

- La aplicación de estos productos genera un incremento en la cuaja y disminuye aborto de frutos.

### STIMULATE® FRUIT SIZER + SETT®

- Aplicar en forma conjunta desde botón floral hasta caída de chaqueta, estimulando naturalmente la productividad y calidad de fruto.

### SUGAR MOVER® + Harvest More® 5-5-45

- Aplicar en forma conjunta desde quiebre de color hasta precosecha. Estimula naturalmente la acumulación de azúcares y la madurez de los frutos.

### N-LARGE®

- Regulador de crecimiento que promueve la elongación celular, generando un incremento en el calibre de la fruta.

### PHYTOGARD® Potasio + ReZist®

- La aplicación de estos productos disminuye el estrés abiótico, promueve el metabolismo de la planta fortaleciendo sus defensas naturales.

### NITRATE BALANCER® PLUS

- Aplicar en post cosecha (primeras hojas amarillas). La aplicación de Nitrate Balancer favorece la transferencia de fotosintatos desde la hojas hacia los órganos de reserva, aumentando los niveles de arginina en yemas y raíces y acelerando la lignificación de tejido, regulando así el crecimiento vegetativo.

### ALGROW®

- Extracto de algas con tecnología Stoller, formulado para promover el desarrollo de las plantas y mitigar los efectos del estrés abiótico.



Para consultas técnicas contactarse con él Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A

stoller@stoller.cl  
www.stoller.cl

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.  
Teléfono +56 (75) 2 314 789

Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.