

RootFEED® Concentrate



ENRAIZANTE

- Es un producto líquido formulado para ser usado a través del riego tecnificado en todo tipo de especies.
- Contiene en su formulación Nitrógeno Amínico de liberación lenta y Cofactores de Crecimiento selectivos.
- Trabaja bajo el concepto de TERAPIA DE SANIDAD VEGETAL.

TERAPIA DE SANIDAD VEGETAL


Estrategía diseñada por Stoller, basada en la aplicación constante de cofactores hormonales y nutrientes con el objetivo de estimular constantemente el desarrollo de las raíces, promoviendo un mayor equilibrio hormonal y desarrollo de la planta, así como la calidad de la fruta.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno Amínico (NH ₂)	9%
Calcio (Ca)	9%
Magnesio (Mg)	1,5%
Cofactores de crecimiento	

Valores expresados en porcentaje peso / volumen

pH	5.07 (a 20°C)
Da	1.24 (g/ml)



PRODUCCION DE HORMONAS



Cada 14 días mueren las células de la cofia radicular; por lo que RootFeed Concentrate reestablece el crecimiento activo de nuevos pelos radiculares absorbentes de manera continua.

EFFECTO ROOTFEED CONCENTRATE EN RAÍCES:

- Estimula el crecimiento continuo de raíces.
- Estimula un desarrollo de un sistema radicular resistente.
- Promueve mayor absorción de nutrientes y síntesis hormonal.
- Estimula la resistencia de la planta a plagas y enfermedades.

RootFEED® Concentrate



ENRAIZANTE

Instrucciones de uso

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Uva de Mesa	20-25 L / ha	Comenzar con la primera aplicación con brotes de 40 cm. La segunda aplicación en cuaja y desde ahí cada 15 días.
Vid Vinífera	20 L / ha	Comenzar en floración y repetir cada 15 días hasta postcosecha.
Frutillas	25 L / ha	Aplicar quincenalmente desde Septiembre a Marzo.
Frutales Caducos: Duraznero, Cerezo, Nectarino, Manzano, Peral, Kiwi, Nogal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Frambueso	20-25 L / ha	Comenzar en floración y repetir cada 15 días hasta postcosecha.
Frutales Persistentes: Naranja, Pomelo, Limonero, Mandarino y Olivo	20-25 L / ha	Aplicar cada 15 días desde floración y durante el desarrollo del fruto.
Cultivos Bajo Invernadero	2,5 cc / m ²	Comenzar desde el primer riego efectivo hasta que la última flor esté cuajada.
Palto	25-30 L / ha	Huertos Decaídos: Aplicar cada 15-20 días desde Noviembre a Febrero. Huertos Normales: Aplicar en floración y repetir cada 15 días hasta completar 4-6 aplicaciones.
Plantaciones Nuevas	15-20 L / ha	Aplicar desde el primer riego efectivo después de plantación y repetir quincenalmente hasta completar al menos 4 aplicaciones.
Arándano	10-15 L / ha	Comenzar las aplicaciones desde floración. Repetir cada 10 días.

OBSERVACIONES

- Las aplicaciones de RootFEED Concentrate deben realizarse en el segundo tercio del tiempo de riego.
- Química y uso de sistemas SAR (Resistencia Sistémica Adquirida) para estimular resistencia a enfermedades y crecimiento de raíces.
- Para los mejores resultados de RootFEED Concentrate, realizar como mínimo 4 aplicaciones. No mezclar RootFEED Concentrate con Sulfatos ni Fosfatos.
- La tecnología detrás de la TERAPIA HORMONAL, desarrollada para RootFEED Concentrate, está cubierta por Patentes Industriales Internacionales:

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
- Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- Agua
- RootFEED Concentrate
- Agroquímico

Stoller en su región es:

XV Región Alvaro Villarreal +56 9. 3 224 0339	III Y IV Región Ulises Pizarro Felipe Pizarro +56 9. 9 534 2016 +56 9. 3 443 3941	V Región Luisa Baeza +56 9. 6 845 3268	Región Metropolitana Oriana Reyes Josefa Bitsch +56 9. 4 248 8538 +56 9. 3 379 4332	VI Región Alejandro Guajardo Nicolás Torres +56 9. 8 916 2012 +56 9. 9 451 4354
VII Región Paula Vargas Nicole Guzmán +56 9. 9 451 4384 +56 9. 3 469 1858	VIII Región Fabían Suescun +56 9. 9 630 6790	IX Región Camilo Quezada +56 9. 4 010 6875	XIV y X Región Antonio Villagra +56 9. 9 537 5239	Jefe Regional Zona Norte (III a VI) Fredy Morales +56 9. 9 451 4385
			Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV) Claudio Romero +56 9. 9 161 8424	



Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

®Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.